Notice : information de l'utilisateur

Glycérine Fagron adultes 2,63 g suppositoires
Glycérine Fagron enfants 1,95 g suppositoires
Glycérine Fagron bébés 0,87 g suppositoires

Glycérol

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.
Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.
- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 7 jours.

Que contient cette notice ?:

1. Qu'est-ce que Glycérine Fagron et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Glycérine Fagron ?
3. Comment utiliser Glycérine Fagron ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Glycérine Fagron ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Glycérine Fagron et dans quel cas est-il utilisé ?

Médicament pour le traitement symptomatique de la constipation passagère des intestins.
Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 7 jours.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Glycérine Fagron?

N'utilisez jamais Glycérine Fagron :
- Si vous êtes allergique au glycérol ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- En cas de douleurs abdominales d'origine incertaine.
- En cas d'empêchement du fonctionnement des intestins (transit intestinal) : paralysie ou obstruction intestinale.
- En cas de symptômes de déshydratation.
- En cas de nausées et de vomissements, d'une inflammation intestinale (rectocolite) et de fissures dans l'anus (fissures anales).

Avertissements et précautions
Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser Glycérine Fagron.
Faites attention à ce médicament :
- En cas d'usage prolongé. Un traitement prolongé aux laxatifs est déconseillé afin d'éviter les risques d'accoutumance.
- Si vous êtes âgé.
- Si vous êtes diabétique. Le taux de sucre (taux de glucose) des personnes souffrant de diabète nécessite un suivi en cas d'usage de ce médicament.
- En cas de constipation chronique. Il est recommandé de modifier vos habitudes alimentaires et d'adopter une alimentation plus riche en fibres.
- Si vous utilisez d'autres médicaments. Veuillez également lire la rubrique «Autres médicaments et Glycérine Fagron».

Veuillez consulter votre médecin si une des mises en garde mentionnées ci-dessus est d'application pour vous, ou si elle l'a été dans le passé.

Enfants et bébés
Utilisez à chaque fois les suppositoires du format correspondant.

Autres médicaments et Glycérine Fagron
Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.
L'accélération du fonctionnement intestinal (transit intestinal) peut affecter la résorption d'autres médicaments.

Glycérine Fagron avec des aliments et boissons
Non applicable.

Grossesse et allaitement
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Grossesse
Glycérine Fagron peut être utilisé sans problème pendant la grossesse.

Allaitement
Glycérine Fagron peut être utilisé sans problème pendant l'allaitement.

Conduite de véhicules et utilisation de machines
Glycérine Fagron n'a pas d'effet sur l'aptitude à conduire ou sur l'utilisation de machines.

3. Comment utiliser Glycérine Fagron ?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

La dose recommandée est de

Adultes
Utiliser toujours les suppositoires au format adéquat.
Introduire le suppositoire profondément dans l'anus ; l'introduction du suppositoire est facilitée par son humidification préalable, ce qui lui permet de mieux glisser. Le suppositoire ne fond pas, mais se dissout. L'effet se manifeste dans les 30 minutes.

En général, il suffit d'utiliser 1 à 2 suppositoires par jour.
Utiliser ce médicament pendant une période aussi brève que possible. Il convient d'essayer de vaincre la constipation chronique en adaptant ses habitudes alimentaires et son mode de vie.

Enfants et bébés
Utiliser toujours les suppositoires au format adéquat.
Introduire le suppositoire profondément dans l'anus; l'introduction du suppositoire est facilitée par son humidification préalable, ce qui lui permet de mieux glisser. Le suppositoire ne fond pas, mais se dissout. L'effet se manifeste dans les 30 minutes.

En général, il suffit d'utiliser 1 à 2 suppositoires par jour.
Utiliser ce médicament pendant une période aussi brève que possible. Il convient d'essayer de vaincre la constipation chronique en adaptant ses habitudes alimentaires et son mode de vie.

Si vous avez utilisé plus de Glycérine Fagron que vous n'auriez dû

En cas d'usage correct le risque de surdosage est très faible, étant donné l'évacuation rapide par défécation. En cas d'erreur ou d'inattention, il est possible d'absorber les suppositoires par la bouche.

Si vous avez utilisé ou pris trop de Glycérine Fagron, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le centre Antipoison (070/245.245).

Les symptômes éventuels après la prise orale d'une dose très importante sont : mal à la tête, nausées, diarrhée, soif, vertiges et confusion.
Traitement: traitement des symptômes.

Si vous oubliez d'utiliser Glycérine Fagron
Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez d'utiliser Glycérine Fagron
Aucune précaution particulière n'est nécessaire.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.
Dans certains cas rares, une irritation ou une sensation de brûlure peut être observée dans la zone du rectum.

Déclaration des effets secondaires
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via
Agence fédérale des médicaments et des produits de santé
www.afmps.be
Division Vigilance :
Site internet: www.notifieruneffetindesirable.be
e-mail: adr@fagg-afmps.be

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver Glycérine Fagron ?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C. A conserver dans l'emballage d'origine à l'abri de l'humidité. Ne pas congeler

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'étiquette après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Glycérine Fagron

- La substance active est le glycérol.
- Les autres composants sont l'eau purifiée et la gélatine.

Aspect de Glycérine Fagron et contenu de l'emballage extérieur
Boîte transparente plastique en polypropylène renfermant 10 et 100 suppositoires.
Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant
Laboratoires Sopreli sprl
Rue de la Pastorale 57
1070 Bruxelles
02/411 37 04
sopreli.belgium@skynet.be

Numéro de l'autorisation de mise sur le marché
Glycérine Fagron adultes 2,63 g suppositoires : BE103966
Glycérine Fagron enfants 1,95 g suppositoires : BE103941
Glycérine Fagron bébés 0,87 g suppositoires : BE103923

Mode de délivrance
Délivrance libre.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est 09/2026.
Date d'approbation AFMPS : 09/2026.